

Prof. Dr. med. Bernd Hellinger
 Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
PD Dr. med. Florian Amtge
 Facharzt für Neurologie



Gemeinshaftspraxis
 Fabrik Sonntag 5a
 79183 Waldkirch
 Tel.: 07681/ 49 400 400
 Fax: 07681/ 49 400 449

Prof. Dr. Hellinger/PD Dr. Amtge, Fabrik Sonntag 5a, 79183 Waldkirch

Herrn
 Dr. med. Wolfram Deißler
 Facharzt für Allgemeinmedizin
 Moosmattenstr. 23
 79098 Freiburg

Waldkirch, den 29.01.2020

n/ Abt. Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie, Ambulanz, Bitte um Terminvereinbarung

Marie-Luise Gebhard, geb. 16.02.1944
 Rötzbuckweg 57, 79104 Freiburg

Sehr geehrter Herr Kollege Deißler,

mit verbindlichem Dank für die freundliche Überweisung berichte ich über oben genannte Patientin.

Diagnose: M. Parkinson vom Tremordominanz-Typ, rechts betont, ED 2015
 Restless-legs-Syndrom mit Augmentation unter Levodopa
 Geringe motorisch-axonale Polyneuropathie

Die Patientin hatte sich in der Zwischenzeit in der Elena-Klinik in Kassel zur Therapie ihres tremordominanten Parkinson-Syndroms sowie des Restless-legs-Syndroms befinden. Die Kollegen hatten die dopaminerge Therapie deutlich erhöht, so dass die Patientin gegenwärtig 4 mg Neupro sowie 4 x täglich Levodopa sowie Levodopa retard zur Nacht einnimmt. Die Therapie mit Tilidin-Tropfen war auf Tilidin-Tabletten umgesetzt worden. Nach Angaben der Patientin hat sich hierunter die nächtliche Situation etwas stabilisiert, so dass die Patientin gegenwärtig nachts für einige Stunden zur Ruhe komme. Das Zittern habe sich insgesamt nur wenig gebessert.
 Ich empfehle der Patientin, die Therapie zunächst unverändert fortzuführen, um den längerfristigen Verlauf abzuwarten, in der Hoffnung, dass die Besserung weiter anhalten wird. Da sich das Zittern allerdings nicht wesentlich gebessert hat, stellt sich erneut die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Tiefen Hirnstimulation, die alternativ im Ncl. subthalamicus oder im Ncl. ventralis intermedius thalami bzw. im dentato-rubro-thalamischen Trakt stattfinden kann. Dies gilt es im weiteren Verlauf mit den Kollegen der Stereotaxie zu diskutieren. Hiermit möchte ich die Patientin zu einer ambulanten Vorbesprechung bei den Kollegen der Stereotaxie anmelden und bitte die Kollegen um einen entsprechenden Termin.

Therapieempfehlung:

Levodopa/Benserazid 100/25 mg	1	3/4	1	0	0	1
Levodopa/Benserazid 200/50 mg ret.	1	0	0	0	0	0
Tilidin Tabletten 50/4 mg	1	0	0	0	0	1
Neupro 4 mg	1 x tgl.					

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

PD Dr. med. F. Amtge