

Nierenzentrum Freiburg

Praxis für Nieren- &
Hochdruckkrankheiten
Dialysezentrum

Fachärzte für
Innere Medizin, Nephrologie
& Hypertensiologie (DHL)

Dr. med. Th. Watter
PD Dr. med. A. Kraemer-Guth
Dr. med. E. Schwertfeger
PD Dr. med. J. Donauer
Dr. med. M. König
Dr. med. K. Breitenfeldt
Dr. med. D. Steffl

Konrad-Goldmann Str. 5
79100 Freiburg
Deutschland

T. +49 (0) 761 38 90 99 0

F. +49 (0) 761 38 90 99 11
info@nzf-freiburg.de

www.nzf-freiburg.de

NZF · Konrad-Goldmann Straße 5 · D-79100 Freiburg

03.10.2019

Dr. Wolfram Deissler
FA f. Allgemeinmedizin
Moosmattenstraße 23
D-79117 Freiburg im Breisgau

Patienteninformation

Herr Karlheinz Argast, geb. am 01.04.1932
aus 79104 Freiburg im Breisgau, Kartäuserstr. 115
- Patient persönlich

Allgemeine Patienten / Dialyseinformation

Liebe KollegInnen im Josefshaus,

soeben teilte uns das Pflegeheim mit, dass Herr Argast wegen Sturz bei Ihnen stationär aufgenommen wurde.

Die Dialysetherapien waren zuletzt technisch nicht mehr durchführbar wegen Kreislaufinstabilität, Apnoephasen und Somnolenz unter Sedierung sowie progredienter Demenz mit Bettflucht / Verweigerung der medizinischen Maßnahmen. Die letzte Dialyse am 1.10. musste nach 1h Behandlungsdauer wegen Kreislaufinstabilität und Somnolenz abgebrochen werden.


Anbei die relevanten Diagnosen und Kontaktdaten der Angehörigen.

Für Rückfragen können Sie mich unter 0175-6858913 kontaktieren.

Herzli. Gruß, Dr. K. Breitenfeldt

Diagnosen:

chronische Nierenersatztherapie seit 03/2013
terminale Nierenkrankheit
Hämodialyse, Anlage einer hohen Unterarmfilstel links am 25.3.2013, passagerer Vorhofkatheteranlage 03/2013
hypertensiv-vaskuläre Nephrosklerose
sekundärer Hyperparathyreoidismus
renale Anämie
metabolische Azidose (renal)
Schwere pulmonale Hypertonie
Z.n. Nikotinabusus bis 2000 (ca 40 PY)
Kombiniertes Aortenvitium, leichte Aorteninsuffizienz, mittelgradige Aortenstenose (Befund Herzzentrum BK 2/2017), derzeit nicht operationsbedürftig
Koronare Herzkrankheit (2-GE); höhergradige Stenosen prox. RIA und prox. sowie mittlerer ACD mit PTCA 16.3.2017, Intervention an LAD 6 (1 STENT)
Thorakales Aortenaneurysma vom Aortenbogen bis zum Thorakoabd.Übergang, teilthrombosiert; Durchmesser max 6 cm, ED 3/2017
Infrarenales Bauchaortenaneurysma, max Weite 42 mm (5/2014)
Rekurrensparese beim Aortenaneurysma
Z.n. oberer Gastrointestinaler Blutung (transfusionspflichtig, mit Hämatemesis und Teerstuhl) bei großem Ulcus Bulbus duodeni 3/2017
PAVK, Beschwerdestadium Fontaine 1/Rutherford 0
Z.n. Schenkelhalsfraktur rechts am 18.1.2017 und H-TEP
Stabile chronisch kompensierte Niereninsuffizienz bei hypertensiv vaskulärer Nephrosklerose
arterielle Hypertonie
monoklonale Gammopathie ohne Anhalt für Befundprogredienz
Pleuropneumonie 3`13
Urämische Ichthyosis
Plattenepithelkarzinom Ohrmuschel rechts mit Mehrfachresektionen 4`18
Senile Form der Alzheimer-Krankheit - mittelschwere Demenz, schwere subkortikale arteriosklerotisch bed.
Enzephalopathie mit Unruhe / Aggressivität, welche die Dialysetherapie beeinträchtigen
Probleme mit Bezug auf eine eingeschränkte Mobilität



Nierenzentrum Freiburg

Praxis für Nieren- &
Hochdruckkrankheiten
Dialysezentrum

Körperliche Untersuchung:

87-jähriger Mann, Trockengewicht 60,5 kg, Größe 177cm, keine peripheren Ödeme, RR 55/32mmHg.

Aktuelle Laborwerte: ; Ambulanz Basislabor (17.09.2019): Hämoglobin: 10,4 g/dl; Leuko: 5,2 tsd/µl; Thrombo: 154 tsd/µl; Hämatokrit: 32,5 %; HbE: 28,4 pg; MCV: 88,8 fl; Kalium: 5,7 mmol/l; Calcium: 2,08 mmol/l;

Aktuelle Medikation:

ASS 100 mg Heumann Tabletten 1-0-0-0 lebenslang
TORASEMID AAA Pharma 200 mg Tabletten ½-½-0-0 an HD Tagen 0-1/2-0

an Dialyse:

1 FS ERYPO FS 4.000 I.E./0,4 ml Fertigspritzen i.v.
1 FS ERYPO FS 8.000 I.E./0,8 ml Fertigspritzen i.v.
1 Amp. FERMED 20 mg/ml Injektionslösung 100 mg Ampullen i.v.
1 Kps DEKRISTOL 20.000 I.E. Weichkapseln oral
1 mg VITAMIN B12 1.000 µg Inject Jenapharm Ampullen i.v.

Dialyseinformation:

Dialyseart/zeit: 3 x 3:30 h/Wo Bica-High-Flux-Hämodialyse, Di-DO-SA 4.0G
Dialysator: FX 100 classix (helixone, High-Flux)
Sollgewicht: 60,5 kg, UF-max: 650 ml/h
Antikoagulation: Heparin Bolus, initial: 2500 IE, 2.Dosis: 0 IE nach 2:00 h
Dialysat: Na: 140, K: 3, Ca: 1,25, Bic: 30 (jeweils mmol/l)
Gefäßzugang: Ciminoshunt li. Unterarm
Punktion: 17 Single Needle
QB: 300 ml/min

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dres. Watter, Kraemer-Guth, Schwertfeger, Donauer, Königer, Breitenfeldt & Steffl