

Herr Heinrich Strasser  
geb. am 13.10.1929  
wohnhaft in 79114 Freiburg, Bugginger Str. 2

Dr. med. Helmut Mielitz  
Buggingerstr. 87  
79114 Freiburg  
Tel: 0761/41421

03.08.17

### Patientenpass:

#### Diagnosen:

PAVK 3 (I70.24G), US Amputation li (Z89.9LG) (Z97.1LG), Phantomschmerz li Fuß (G54.6LG) US, Hypertonie (I10.90G), Dil. Kardiomyopathie (I42.0G), Cor pulmonale (I27.9G), Herzinsuffizienz (I50.9G) kard. Dekomp 2017, Mitralklappeninsuff. (I34.0G), Trikuspidalklappeninsuff. (I07.1G), Abs. Arrhythmie b Vorhofflimmern (I48.9G), rez. oberer Gastrointest. Blutungen bei Gefäßmalformation (K92.2G). Kein ASS u. Marcumar mehr!!!!, Gastroös. Reflux (K21.9G), Sprue (K90.1G), Skoliose (M41.99G), Spinalkanalstenose (M48.09G) L2-3-4, Chron. Schmerzpatient (R52.2G), Obstipation bei Morphintherapie (K59.0G), Altersveränderungen (R54G), Peritrochantäre Femurfraktur links (S72.10G) OP 17.7.17

#### Medikamente:

Medikament	morgens	mittags	abends	zur Nacht	Hinweise
Bisoprolol-ratiopharm® 5mg 100 Tbl. N3	0.5				herz
Calcium D3 Actavis 1000mg/880 I.E. 90 Kautbl.		0.5			knochen
* Clezanc 40mg Axicorp 0,4ml 20 Fertigspr. N2			1		nach Fraktur
Polsan® 5mg 100 Tbl. N3		1			
gabapentin-biomo® 400mg 200 Hartkaps. N3	1-2	1-2	1-2	1-2	phantomschmerz
Macrogol STADA® 13,7g Pulv. 50 Btl. N3	1 bis 3 Btl		1		verstopfung
Novaminsulfon Lichtenstein 500mg 50 Filartbl. N3	max 4x2				Schmerz
Pantoprazol Aurobindo 20mg 100 magensaft. Tbl. N3	1		1		magen
Simvastatin - 1 A Pharma® 40mg 100 Filmtabl. N3	0	0	1	jeden 2. tag	cholesterin
SPIRONOLACTON AWD 50MG TAB TAB 100 St		1			wasser, herz
Oxycodon-HCl AL 10mg 100 Retardt. N3	1		1		Schmerz
Torasemid AL 20mg 100 Tbl. N3	1	1		+ b bed	wasser, herz

bis Packung leer, dann beenden bei Gefahr der Magen- u. Darm. Störung.

Neu abgrenzbarer Pleuraerguss rechts basolateral. Links kein Pleuraerguss. Zentral vermehrte Gefäßzeichnung, passend zu einer chronischen Stauung. Kein umschriebenes Infiltrat. Neu abgrenzbare rundliche Verdichtung in Projektion auf die dorsale 6. Rippe rechts, 4 mm messend, ggf. weitere Abklärung empfohlen. Kein Pneumothorax. Pleurakuppenschwielen beidseits. Kardiomegalie. Kein Mediastinalshift.

**Letzte medikamentöse Therapie:**

Bisoprolol	5mg	1/2-0-0
Calcium	1000mg	0-1/2-0
Gabapentin beta	400mg	2-1-1-2
Macrogol	13,7g	Btl 1-0-1
Pantozol	20mg	1-0-1
Simvastatin	40mg	0-0-1
Spironolacton	50mg	1-0-0
Oxycodon	5mg	1-0-1
Torasemid	10mg	1-1-0
Folsäure	5mg	1-0-0
Clexane	40mg s.c.	0-0-1

Selbstverständlich können äquipotente Generika eingesetzt werden.

**Weitere Empfehlung:**

Wir möchten um weitere Wund- und Befundkontrollen durch Sie bitten. Die intensive krankengymnastische Übungsbehandlung zur weiteren Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit, der muskulären Kraft, Stabilität und Mobilität sollte fortgeführt werden. Hierbei darf die operierte Extremität voll belastet werden. Weiterführen der abschwellenden Therapie für den Stumpf bis ein passgerechter Sitz der Prothese erreicht ist. Wir empfehlen die Thromboembolie-Prophylaxe mit einem NM-Heparin bis zum Erreichen eines beschwerdefreien Gangbildes unter wöchentlichen Blutbildkontrollen fortzuführen. Die ambulante Weiterbehandlung sollte durch einen niedergelassenen Orthopäden/Chirurgen erfolgen. Die nächste Röntgenkontrolle empfehlen wir nach der 12. postoperativen Woche durchzuführen.

Wir empfehlen außerdem die weitere ambulante Abklärung des Rundherds der rechten Lunge.

Eine Spätreha im Intervall von 6 Wochen ist bereits beantragt.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. W. Schlickewei  
Chefarzt

Dr. med. K. Nowack  
Oberarzt

Dr. med. F. Dietrich  
Assistenzarzt

**Empfänger:**

Herrn Dr. med. Helmut Mielitz, Allgemeinmedizin, Buggingerstr. 87, 79114 Freiburg im Breisgau

**Nachrichtlich an:**

Strasser, Heinrich, Bugginger Str. 2, 79114 Freiburg im Breisgau

Betr. Patientepass  
H. Strasse !

---

hat in der Klinik / <sup>Kopie</sup> anbei /  
kein Novaminsulfon  
H. Therapieplan erhalten.

Frage: ob weitere  
Sonst auf Plan  
durchstreichen.